



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

17^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Σιόντη,
email: psionti@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: 2132005352



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68514a863e7c231e236e9678
ΑΠ:750943
Υπογραφή: 18/06/25 12:03
Διανομή: 19/06/25 12:00

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ. ΙΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
και ΙΡΙΔΑ**

Παλλήνη,

- Προς:
1. Δήμους Ανατολικής Αττικής
(με την παράκληση ανάρτησης)
 2. Αγροτικούς Συλλόγους/Συνεταιρισμούς
Ανατολικής Αττικής
 3. Επιχειρήσεις Ανατολικής Αττικής:
 - εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
 - Συνταγογράφοι Γεωργικών
Φαρμάκων
 - Χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων

- Κοιν.:
1. ΥΠΑΑΤ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
E-mail: charampatzis@minagric.gr
 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτ.
Οικον. & Κτηνιατρικής
 3. Γραφείο Γενικής Δ/σης

**ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας
Scirtothrips dorsalis στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της νήσου Κρήτης»**

ΣΧΕΤ.: Το π' αρ. πρωτ. 156797/12.6.2025 έγγραφο του ΥπαΑΤ

**1. Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Scirtothrips dorsalis* σε περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.**

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΥπαΑΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Scirtothrips dorsalis* σε Ανθοκομικό Κέντρο της Π.Ε. Χανίων.

Το έντομο αυτό αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για την Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 και το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

Για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς του *Scirtothrips dorsalis* στο έδαφος της Ένωσης λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 καθώς και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

2. Βασικές πληροφορίες για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας *Scirtothrips dorsalis*.

Είναι είδος ιθαγενές της Ασίας όπου βρίσκεται σε πολλές χώρες όπως είναι το Ισραήλ, το Μπανγκλαντές, η Μπρουνέι, η Κίνα, το Hong Kong, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Μαλαισία, η Μιανμάρ, το Πακιστάν, η Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα, η Ταϊβάν και η Ταϊλάνδη. Είναι εγκατεστημένο σε περιοχές της Αφρικής όπως είναι η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ουγκάντα, σε περιοχές της Αμερικής όπως οι ΗΠΑ, η Βενεζουέλα, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το Σουρινάμ, το Πουέρτο Ρίκο, η Τζαμάικα και η Γουαδελούπη. Είναι επίσης εγκατεστημένο σε πολλές περιοχές της Ωκεανίας. Το 2017 διαπιστώθηκε η παρουσία του στην Ισπανία και το 2024 στην Πορτογαλία.

Έχει πολύ μεγάλο εύρος ξενιστών προσβάλλοντας είδη φυτών όπως τα εσπεριδοειδή, τα ακτινίδια, η αραχίδα, η πιπεριά, το βαμβάκι, η φράουλα, το αμπέλι, η ορτανσία, τα κρεμμύδια, τα μάνγκο, η τριανταφυλλιά, ο ταμάρινδος, διάφορα ψυχανθή όπως η ακακία, η μιμόζα κ.λπ.

Τα έντομα τρέφονται σε βάρος των επιδερμικών κυττάρων ή ακόμα και αυτών του δρυφακτοειδούς παρεγχύματος, των νεαρών φύλλων και του άνω μέρους των νεαρών καρπών, όπου πολλές φορές βρίσκονται κρυμμένα κάτω από τον κάλυκα. Το είδος δεν τρέφεται σε βάρος των ώριμων φύλλων. Τα αβγά τοποθετούνται εντός των νεαρών ιστών. Το έντομο έχει δύο προνυμφικά στάδια τα οποία ακολουθούνται από δύο νυμφικά. Η νύμφωση γίνεται στο έδαφος εντός της στρωμνής των πεσμένων φύλλων. Η ανάπτυξη του εντόμου είναι συνεχής με σημαντική επιβράδυνση κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η τροφική δραστηριότητα των εντόμων προκαλεί επάργυρο χρωματισμό στην επιφάνεια των φύλλων, καφέ στιγμάτωση των φύλλων και των καρπών, καφέ έως μαύρες εσχαρώσεις στους καρπούς που συνήθως εμφανίζονται με τη μορφή κύκλου στην πάνω πλευρά αυτών γύρω από τον κάλυκα με τελική κατάληξη την παραμόρφωση των καρπών και την πρόωρη γήρανση των φύλλων. Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά που προκαλούν και άλλα είδη θριπών που υπάρχουν στη χώρα και προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή.

Το γένος *Scirtothrips* περιλαμβάνει πάνω από 100 είδη, τα οποία βρίσκονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Τα είδη του γένους *Scirtothrips*, όπως και τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας των Thripidae, έχουν 5 στάδια ανάπτυξης: αβγό, 2 προνυμφικές ηλικίες, 2 νυμφικές ηλικίες και ενήλικο. Τα αβγά τοποθετούνται εντός των τρυφερών ιστών των νεαρών φύλλων, βλαστών και καρπών. Τα ανήλικα της πρώτης και της δεύτερης προνυμφικής ηλικίας βρίσκονται πάνω στα πράσινα μέρη των φυτών τρεφόμενα σε βάρος των τρυφερών ιστών. Τα άτομα της δεύτερης προνυμφικής ηλικίας αναζητούν κάποια προφυλαγμένη θέση (στρωμή των φύλλων ή ρωγμές του φλοιού) όπου και νυμφώνονται. Σε σπάνιες περιπτώσεις οι νύμφες μπορεί να βρεθούν και κάτω από τον κάλυκα των καρπών. Τα ενήλικα είναι πτερωτά και βρίσκονται πάνω στα φυτά όπου και τρέφονται σε βάρος των τρυφερών φυτικών τμημάτων όπως και οι προνύμφες.

Τα αβγά έχουν νεφροειδές σχήμα με μέγεθος που δεν ξεπερνά τα 0,2 mm. Οι προνύμφες έχουν ατρακτοειδές σχήμα σώματος, χρωματισμό από κίτρινο έως πορτοκαλί και είναι μόλις ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Τα ενήλικα έχουν κόκκινο πορτοκαλί χρωματισμό και μήκος σώματος που δεν ξεπερνά το 1mm.

Η ικανότητα για φυσική διασπορά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το έντομο μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις μέσω των φυτών προς φύτευση, κυρίως αυτά που διαθέτουν τρυφερούς ιστούς και της μεταφοράς ανθισμένων φυτών. Θα μπορούσε να μεταφερθεί και μέσω του χύματος ως νύμφη. Η πιθανότητα μεταφοράς με ώριμους καρπούς είναι πάρα πολύ μικρή.

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, αποτελεί υποχρέωση τόσο των επαγγελματιών όσο και του ευρύτερου κοινού να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αγγελική Χατζοπούλου