




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
17° χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Σιόντη,
email: psionti@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: 2132005352



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & ΙΡΙΔΑ

Παλλήνη,

- Προς:
1. Δήμους Ανατολικής Αττικής
(με την παράκληση ανάρτησης)
 2. Αγροτικούς Συλλόγους/Συνεταιρισμούς
Ανατολικής Αττικής
 3. Επιχειρήσεις Ανατολικής Αττικής:
 - εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
 - Συνταγογράφοι Γεωργικών
Φαρμάκων
 - Χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων
 4. Εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό
μητρώο ενδιαφερόμενοι
 5. Εγγεγραμμένοι στο ΜΕΝΟ
ενδιαφερόμενοι
- Κοιν.:
1. ΥΠΑΑΤ
Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
(υπόψη κ. Αραμπατζή)
 2. Γραφείο Περιφερειακής Συμβούλου κας
Αγγελάκη
 3. Γραφείο Γενικής Δ/σης

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diaphorina citri* στη νήσο Ρόδο – Λήψη επισήμων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς και την εξάλειψη του σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 222726/31.8.2026 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχετικά με το θέμα

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας για την Ε.Ε., *Diaphorina citri* στη νήσο Ρόδο.
Σύμφωνα με το Α.Π.: ΕΠ 1188/04-08-2026 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, **επιβεβαιώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Diaphorina citri* [Εκτ. Καν (ΕΕ) 2019/2072] σε οπωρώνα πορτοκαλιών στη νήσο Ρόδο.** Τα δείγματα του επιβλαβούς οργανισμού προέρχονται από συλλήψεις σε παγίδες που έχουν τοποθετηθεί στα πλαίσια του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.

Το *Diaphorina citri* είναι ευρέως διαδεδομένο στις ασιατικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταιβάν, Βιετνάμ). Η παρουσία του έχει επίσης διαπιστωθεί τόσο στην Κεντρική όσο και στην Νότια Αμερική (ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή, Κούβα, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα). Στην Ευρώπη έχει διαπιστωθεί στην Κύπρο το 2023. Οι κύριοι ξενιστές του εντόμου *D. citri* είναι διάφορα είδη φυτών του γένους *Citrus* (εσπεριδοειδή). Μεγαλύτερη ευπάθεια εμφανίζουν οι νεραντζιές (*Citrus aurantium*), οι μοσχολεμονιές, (*Citrus aurantifolia*), των οποίων οι καρποί είναι γνωστοί ως «λάιμ», τα γκρεϊπφρουτ (*Citrus paradisi*), τα *Citrus jambhiri* και τα *Murraya paniculata*, ενώ, οι πορτοκαλιές (*Citrus sinensis*), οι λεμονιές (*Citrus limon*), το καλαμοντίν (*Citrofortunella microcarpa*) και το *Poncirus trifoliata* εμφανίζουν σχετικά μικρότερη ευπάθεια (πλήρης κατάλογος φυτών ξενιστών του εντόμου υπάρχει στον ακόλουθο ιστότοπο του ΕΡΡΟ: <https://gd.eppo.int/taxon/DIAACI/hosts>).

Το *D. citri* είναι πιο διαδεδομένο σε ζεστές παράκτιες περιοχές. Οι βέλτιστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του είναι 25-28°C, ωστόσο μπορεί να αντέξει σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αφθονία των φυτών ξενιστών υποδεικνύουν ότι το *D. citri* μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί στην χώρα μας.

Τα συμπτώματα της προσβολής της εν λόγω ψύλλας έχουν ως εξής: Τα προσβεβλημένα φύλλα είναι παραμορφωμένα, συστρέφονται και καταρρώνουν ενώ σε σοβαρή προσβολή παρατηρούνται ξηράνσεις και πρόωρη φυλλόπτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζεται το σύμπτωμα «σκούπα της μάγισσας», δηλαδή έκπτυξη πολλών καχεκτικών βλαστών μικρού μήκους λόγω προσβολής των οφθαλμών. Επίσης, από την δραστηριότητα του εντόμου παράγονται μελιτώδη εκκρίματα επί των οποίων αναπτύσσονται οι μύκητες της καπνιάς. Χαρακτηριστικό των νυμφών του *D. citri* είναι ότι παράγουν λεύκα κηρώδη νημάτια.

Ωστόσο, η σημαντικότερη ζημιά που προκαλεί το έντομο σχετίζεται με τη μετάδοση των βακτηρίων *Candidatus Liberibacter africanus*, *Candidatus Liberibacter americanus* και *Candidatus Liberibacter asiaticus* τα οποία προκαλούν την ασθένεια που ονομάζεται πρασίνισμα των εσπεριδοειδών (**citrus greening**) ή ασθένεια του “κίτρινου δράκου” (yellow dragon disease, ‘Huang long bing’). Η ασθένεια προκαλεί κηλιδωση και μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων που μοιάζει με τα συμπτώματα που προκαλεί η τροφοπενία ψευδαργύρου. Τα δένδρα παρουσιάζουν φυλλόπτωση και καρπώπωση. Οι καρποί παραμένουν πράσινοι στην μια πλευρά τους και ο χυμός τους έχει πικρή γεύση. Τα δένδρα ξεραίνονται μέσα σε 5-7 χρόνια από τη στιγμή που μολύνθηκαν. Η ασθένεια «citrus greening» θεωρείται ως μια από τις πιο καταστροφικές ασθένειες των εσπεριδοειδών.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. **Οι καρποί εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκο προκειμένου να διακινηθούν στην επικράτεια της Ένωσης, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα XIII του Εκτελεστικού Καν.(Ε.Ε) 2019/2072, όπως ισχύει.
2. **Δεν επιτρέπεται η διακίνηση καρπών με φύλλα και ποδίσκους από προσβεβλημένες περιοχές.**
3. Η μεταφορά φυτών-ξενιστών με σκοπό τη φύτευση τους επιτρέπεται με τη συνοδεία Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου.
4. Προσοχή στη διάγνωση: Παρόμοια συμπτώματα προκαλούν ο φυλλοκνίστης (*Phyllocnistis citrella*) και οι μελίγκρες.

Συνημμένα αποστέλλεται και **ενημερωτικό φυλλάδιο** του ΥπΑΑΤ με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας. Παρακαλούνται οι δήμοι, οι αγροτικοί σύλλογοι και τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων για την ανάρτηση του φυλλαδίου προς ενημέρωση παραγωγών και κοινού.

Με Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αγγελική Χατζοπούλου