



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &  
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
17° χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη  
Πληροφορίες: Π. Σιόντη,  
email: [psionti@patt.gov.gr](mailto:psionti@patt.gov.gr)  
Τηλέφωνο: 2132005352



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
69aacbd64f25d253f9c4f0e8  
ΑΠ:306576  
Υπογραφή: 09/03/26 15:25  
Διανομή: 10/03/26 09:14

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & ΙΡΙΔΑ

Παλλήνη,

- Προς:
1. Δήμους Ανατολικής Αττικής  
(με την παράκληση ανάρτησης)
  2. Αγροτικούς  
Συλλόγους/Συνεταιρισμούς  
Ανατολικής Αττικής
  3. Επιχειρήσεις Ανατολικής Αττικής:
    - εμπορίας γεωργικών  
φαρμάκων
    - Συνταγογράφοι Γεωργικών  
Φαρμάκων
    - Χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων
- Κοιν.:
1. ΥΠΑΑΤ  
Δ/ση Προστασίας Φυτικής  
Παραγωγής  
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  
E-mail: [charampatzis@minagric.gr](mailto:charampatzis@minagric.gr)
  2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτ.  
Οικον. & Κτηνιατρικής
  3. Γραφείο Γενικής Δ/νσης

**ΘΕΜΑ:** «Υλοποίηση Φυτοϋγειονομικών Μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας *Bactrocera dorsalis* και *Bactrocera zonata*, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/311»

**ΣΧΕΤ.:**

1. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/311 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2025 σχετικά με τα μέτρα για την εξάλειψη και την πρόληψη της εγκατάστασης και της εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης των μυγών των φρούτων των ειδών *Bactrocera dorsalis* (Hendel), *Bactrocera latifrons* (Hendel) και *Bactrocera zonata* (Saunders)
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 33119/10.2.2026 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχετικά με το θέμα
3. Η υπ' αριθ. πρωτ. 229660/20.2.2026 Απόφαση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την «Οριοθέτηση Ζωνών που εμπίπτουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας *Bactrocera dorsalis* και *Bactrocera zonata*, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/311»

**1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ *BACTROCERA DORSALIS* ΚΑΙ *BACTROCERA ZONATA* ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**α) *Bactrocera dorsalis*:** Το 2025 στην Περιφέρεια Αττικής αναπτύχθηκε ένα δίκτυο παρακολούθησης του εντόμου. Στις 8/7/2025 στην Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα Αθηνών υπήρξε ταυτόχρονα η σύλληψη 16 ενήλικων αρσενικών. Ακολούθησαν σποραδικές συλλήψεις του εντόμου σε διάφορες παγίδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και σε μία θέση στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Χρονικά, οι παγίδες εκτείνονταν σε όλη την περίοδο από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. **Συνολικά το 2025 σε 23 παγίδες συνελήφθησαν 41 ενήλικα αρσενικά του εντόμου.**

**β) *Bactrocera zonata*:** Η παρακολούθηση του εντόμου πραγματοποιείται μέσω του ίδιου δικτύου παγίδων που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση του *Bactrocera dorsalis*. Η πρώτη σύλληψη καταγράφηκε στις 17/6/2025 σε παγίδα της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. Ακολούθησαν συλλήψεις του εντόμου και σε παγίδες των Π.Ε. Κεντρικού και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Οι συλλήψεις εκτείνονταν χρονικά από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. Σε σχέση με το *B. dorsalis*, η περιοχή που υπήρξαν θετικά ευρήματα ήταν αρκετά μεγαλύτερη, καλύπτοντας μια έκταση της τάξεως των 50 Km<sup>2</sup>. **Συνολικά υπήρξαν 35 θετικές παγίδες και συνελήφθησαν 43 ενήλικα αρσενικά του εντόμου, με το μεγαλύτερο αριθμό των θετικών παγίδων να βρίσκεται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών στην ίδια περιοχή που υπήρχαν οι συλλήψεις του *B. dorsalis*.**

## 2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΞΕΝΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα είδη αυτά παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα και εξαιρετικά μεγάλη πολυφαγία.

- Κύριοι Ξενιστές: Εσπεριδοειδή (με ιδιαίτερη προτίμηση στη νεραντζιά), ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, σύκα, λωτοί, μάνγκο, καθώς και κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά).
- Βιολογικός Κύκλος: Το θηλυκό εναποθέτει τα αυγά (νύγματα) εντός της σάρκας των καρπών. Οι προνύμφες εκκολάπτονται και τρέφονται με τη σάρκα, οδηγώντας τον καρπό σε σήψη. Η ανάπτυξη των προνυμφών ολοκληρώνεται εντός του καρπού, ο οποίος συχνά πέφτει στο έδαφος, όπου και πραγματοποιείται η νύμφωση.
- Συμπτώματα:
  - Εμφάνιση νυγμάτων ωστοκίας στην επιδερμίδα του καρπού.
  - Μεταχρωματισμός γύρω από τα νύγματα και, σε καρπούς με υψηλά σάκχαρα (π.χ. ροδάκινα), εκροή υγρών που στερεοποιούνται.
  - Εσωτερική σήψη και πρόωρη πτώση των καρπών.

Επισυνάπτονται δύο (2) φυλλάδια του ΥΠΑΑΤ καθώς και τα ενημερωτικά που απέστειλε η υπηρεσία μας με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία, τους ξενιστές και τα συμπτώματα της προσβολής των *Bactrocera dorsalis* και *Bactrocera zonata*.

## 3. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Τα έντομα των ειδών *Bactrocera dorsalis* και *Bactrocera zonata* αποτελούν ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας για την Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 και το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1702 περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του σοβαρού δυνητικού οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου για το έδαφος της Ένωσης. Για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς τους στο

έδαφος της Ένωσης λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/311 με τίτλο: «**Μέτρα για την εξάλειψη και την πρόληψη της εγκατάστασης και της εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης των μυγών των φρούτων των ειδών *Bactrocera dorsalis* (Hendel), *Bactrocera latifrons* (Hendel) και *Bactrocera zonata* (Saunders)**». Τα εν λόγω είδη αποτελούν οργανισμούς καραντίνας υψηλού κινδύνου, με εξαιρετικά μεγάλη προσαρμοστικότητα, πολυφαγία και ικανότητα ταχείας εξάπλωσης. Η εγκατάστασή τους σε αστικό περιβάλλον ευνοείται από την ύπαρξη ιδιωτικών κήπων, καλλωπιστικών και καρποφόρων δέντρων, καθώς και από την ανεξέλεγκτη διακίνηση φυτικού υλικού. Οι αστικές περιοχές συχνά λειτουργούν ως «εστίες εκκίνησης» για την περαιτέρω διασπορά τους προς αγροτικές - παραγωγικές ζώνες. **Η λήψη φυτοϋγειονομικών μέτρων σε αστικές περιοχές είναι κρίσιμη**, καθώς:

- περιορίζει την πιθανότητα μόνιμης εγκατάστασης των πληθυσμών,
- μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης προς τις κύριες αγροτικές περιοχές της χώρας,
- προστατεύει την εθνική αγροτική παραγωγή και τις εξαγωγές, αποτρέποντας σοβαρές οικονομικές απώλειες και εμπορικούς περιορισμούς τρίτων χωρών.

#### **4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ**

Στο πλαίσιο αυτό η **Περιφέρεια Αττικής** αποφάσισε και προχώρησε στην **οριοθέτηση ζωνών** που εμπίπτουν σε περιοχές αρμοδιότητάς της, λόγω της εμφάνισης των Ενωσιακών Επιβλαβών Οργανισμών Καραντίνας ***Bactrocera dorsalis*** (Hendel) και ***Bactrocera zonata*** (Saunders), που αποτελούν οργανισμούς προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2025/311.

Οι **οριοθετημένες ζώνες** έχουν ως εξής (Εικόνα):

**A) Προσβεβλημένη ζώνη (infested zone)**, η οποία περιλαμβάνει:

- α) Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Γαλασίου, Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, Δήμος Αθηναίων (1ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα),
- β) Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μεταμορφώσεως, Δήμος Νέας Ιωνίας,
- γ) Δυτικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Δ.Δ. Αγίων Αναργύρων), Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Χαϊδαρίου (τμήμα).

Η μολυσμένη ζώνη έχει έκταση περίπου 93 km<sup>2</sup>.

**B) Ζώνη ασφάλειας (buffer zone)**, η οποία περιλαμβάνει:

- α) Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Βύρωνος, Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ηλιουπόλεως, Δήμος Καισαριανής, Δήμος Αθηναίων (1ο Δημοτικό Διαμέρισμα),

β) Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Κηφισιάς (τμήμα), Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Δήμος Χαλανδρίου,


γ) Δυτικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Καματερό), Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Χαϊδαρίου (τμήμα),

δ) Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Παλαιού Φαλήρου,

ε) **Ανατολική Αττική: Δήμος Αχαρνών-Θρακομακεδόνων (τμήμα),**

στ) Πειραιάς: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δήμος Πειραιά, Δήμος Περάματος.

Η έκταση της ζώνης ασφαλείας είναι περίπου 250 km<sup>2</sup>.



**Εικόνα: Χαρτογραφική αποτύπωση των οριοθετημένων ζωνών της Περιφέρειας Αττικής για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας *Bactrocera dorsalis* και *B. zonata*.**

## **5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ *Bactrocera dorsalis* & *Bactrocera zonata*, (ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2025/311)**

### **A. Υποχρεώσεις Διακινήτων Καρπών από Φυτά-Ξενιστές**

Καρποί φυτών-ξενιστών που παράγονται ή αποθηκεύονται στην προσβεβλημένη ζώνη, μπορούν να μετακινούνται από την εν λόγω ζώνη προς τη ζώνη ασφαλείας ή εκτός της οριοθετημένης περιοχής, μόνο εάν έχουν υποβληθεί σε αποτελεσματική επεξεργασία κατά του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Καρποί φυτών-ξενιστών μπορούν να μετακινούνται από την προσβεβλημένη ζώνη προς τη ζώνη ασφαλείας

ή εκτός της οριοθετημένης περιοχής: α) για σκοπούς εφαρμογής κατάλληλης επεξεργασίας, εάν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών *B. dorsalis* και *B. zonata*, κατά τη μεταφορά, β) προέρχονται εκτός της οριοθετημένης περιοχής και μετακινούνται μέσω της μολυσμένης ζώνης λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της προσβολής τους από τους επιβλαβείς οργανισμούς *B. dorsalis* και *B. zonata*, ή γ) οι συγκεκριμένοι καρποί συλλέχθηκαν σε εποχή του έτους όπου δεν αναμένεται να εμφανιστούν ζωντανά στάδια του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στους εν λόγω καρπούς, λόγω της αναπαραγωγικής βιολογίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

#### **B. Υποχρεώσεις Διακινήτων Φυτών-Ξενιστών Προς Φύτευση**

Τα φυτά-ξενιστές που προορίζονται για φύτευση και μετακινούνται από την προσβεβλημένη ζώνη προς τη ζώνη ασφαλείας ή εκτός της οριοθετημένης περιοχής δεν φέρουν καρπούς και, στην περίπτωση προσκολλημένου σε αυτά χώματος ή άλλου καλλιεργητικού υποστρώματος, το εν λόγω χώμα είναι απαλλαγμένο από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς.

Χώμα από το ανώτερο στρώμα 10 cm του επιφανειακού εδάφους, από τους τόπους παραγωγής όπου παρήχθησαν οι συγκεκριμένοι καρποί, μπορεί να μετακινείται από την προσβεβλημένη ζώνη προς τη ζώνη ασφαλείας ή εκτός της οριοθετημένης περιοχής, μόνον εφόσον έχει υποβληθεί σε κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Τα υπολείμματα από τους συγκεκριμένους καρπούς απορρίπτονται με ασφάλεια, κατά τρόπο που εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξάπλωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

**Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων είναι επιβεβλημένη για την προστασία της φυτικής παραγωγής της Χώρας και την αποτροπή σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων από ενδεχόμενους εμπορικούς αποκλεισμούς.**

Συνημμένα: 1. Τα ανωτέρω 1-3 σχετικά έγγραφα

2. Υπ' αριθ. πρωτ. 869199/13.7.2025 ενημερωτικό έγγραφο της υπηρεσίας μας με πληροφορίες σχετικά με το έντομο *Bactrocera zonata*

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 7025/180559/21.6.2024 έγγραφο του ΥπΑΑΤ με πληροφορίες σχετικά με το έντομο *Bactrocera dorsalis*

4. Ενημερωτικά φυλλάδια του ΥπΑΑΤ για τα εν λόγω έντομα