@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ae3151d283ba4e8b164df4c
ΑΠ:1413615
Υπογραφή: 02/11/26 10:19
Διανομή: 02/11/26 10:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
Τ.Κ. 15351, Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Σιόντη,
email: psionti@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: 2132005352

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ και ΙΡΙΔΑ

Παλλήνη,

Προς:
1. Δήμους Ανατολικής Αττικής
   (με την παράκληση ανάρτησης)
2. Αγροτικούς Συλλόγους/Συνεταιρισμούς Ανατολικής Αττικής
3. Επιχειρήσεις Ανατολικής Αττικής:
   - Εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
   - Συνταγογράφοι Γεωργικών Φαρμάκων
   - Χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων
   - Εγγρεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο ενδιαφερόμενοι
   - Εγγεγραμμένοι στο ΜΕΝΟ ενδιαφερόμενοι

Κοιν.:
1. ΥΠΑΑΤ
   Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
   Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
   E-mail: charampatzis@minagric.gr
2. Γραφείο Περιφερειακής Συμβούλου κας Αγγελάκη
3. Γραφείο Γενικής Δ/νσης

ΘΕΜΑ: **«Ενημέρωση σχετικά με την πρώτη εμφάνιση στη χώρα του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Liriomyza sativae* (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής – Λήψη επισήμων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς και την εξάλειψή του σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.»**

ΣΧΕΤ.: **Το υπ' αρ. πρωτ. 264694/14.10.2026 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)**

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας για την Ε.Ε., *Liriomyza sativae*, στην Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Σας ενημερώνουμε ότι **επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Liriomyza sativae* Blanchard [Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙ, Εκτ. Καν. (ΕΕ) 2019/2072] σε δείγμα φύλλων γυψοφίλης (*Gypsophila* spp.) προερχόμενο από επιχείρηση παραγωγής δρεπτών ανθέων στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Νήσων Αττικής.** Το δείγμα παραλήφθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) στις 28-09-2026, στο πλαίσιο ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής προς τη Σερβία, και η ταυτοποίηση έγινε με μοριακή μέθοδο σύμφωνα με το διαγνωστικό πρωτόκολλο EPPO PM 7/129 (2).

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διαπίστωση του *L. sativae* στην ελληνική επικράτεια. Το είδος είναι ιθαγενές της αμερικανικής ηπείρου, όπου θεωρείται από τα πλέον καταστροφικά είδη της οικογένειας Agromyzidae, και έχει εξαπλωθεί στην Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία. Στην περιοχή του EPPO έχει αναφερθεί σε Αρμενία, Ισραήλ, Ιορδανία, Μάλτα, Ρωσία, Τουρκία και Ουζμπεκιστάν. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναφερθεί μόνο ο εντοπισμός ενός ατόμου στη Μάλτα το 1995, χωρίς έκτοτε να υπάρχουν άλλες αναφορές για την παρουσία του. Η εισαγωγή του σε νέες περιοχές γίνεται κυρίως μέσω της διακίνησης φυτικού υλικού (φυτά προς φύτευση, δρεπτά άνθη, φυλλώδη λαχανικά) που φέρει αβγά ή προνύμφες, ενώ τα ενήλικα έχουν περιορισμένη ικανότητα πτήσης και διασπείρονται σε μικρές αποστάσεις με τον άνεμο.

Το έντομο είναι εξαιρετικά πολυφάγο, με ξενιστές σε 14 τουλάχιστον βοτανικές οικογένειες, κυρίως Solanaceae, Fabaceae, Cucurbitaceae και Asteraceae. Στους κύριους ξενιστές συγκαταλέγονται η τομάτα, η πιπεριά, η μελιτζάνα, η πατάτα, το αγγούρι, το πεπόνι, το καρπούζι, η κολοκύθα, το φασόλι, το μπιζέλι, το μαρούλι, το λάχανο, το κουνουπίδι, το βαμβάκι, είδη *Allium* και καλλωπιστικά φυτά όπως η γυψοφίλη, το χρυσάνθεμο και η ζέρμπερα (πλήρης κατάλογος: https://gd.eppo.int/taxon/LIRISA/hosts). Οι θερμές κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, η έκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών και η αφθονία ξενιστών υποδεικνύουν ότι το *L. sativae* μπορεί να εγκατασταθεί και να εξαπλωθεί εύκολα, ιδίως σε προστατευμένες καλλιέργειες, όπου μπορεί να αναπτύσσει πολλαπλές γενεές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα θηλυκά εναποθέτουν τα αβγά τους μέσα στο έλασμα του φύλλου και οι τρεις προνυμφικές ηλικίες αναπτύσσονται εντός του μεσόφυλλου δημιουργώντας **χαρακτηριστικές ακανόνιστες, ελικοειδείς στοές λευκού χρώματος με ίχνη σκούρων αποχωρημάτων**. Οι ώριμες προνύμφες εξέρχονται από ημικυκλική οπή και νυμφώνονται κατά κανόνα στο έδαφος. Σε θερμοκρασίες 20–30 °C ο βιολογικός κύκλος

ολοκληρώνεται σε 2–3 εβδομάδες. Τα ενήλικα είναι μικρές μύγες μήκους 1–3 mm, μαύρου χρώματος με κίτρινη κεφαλή, κίτρινο θυρεό (scutellum) και κίτρινες πλευρικές περιοχές. Η ζημιά συνίσταται στη μείωση της φωτοσυνθετικής επιφάνειας, στην πρόωρη φυλλόπτωση, στην ολική καταστροφή νεαρών φυταρίων σε σοβαρές προσβολές, στην υποβάθμιση της εμπορικής αξίας δρεπτών ανθέων και φυλλωδών λαχανικών και στην είσοδο μυκήτων και βακτηρίων από τα νύγματα διατροφής και ωοτοκίας των ενηλίκων. **Επισημαίνεται ότι τα συμπτώματα δεν διαφοροποιούνται μακροσκοπικά από εκείνα των ήδη παρόντων ειδών *L. trifolii*, *L. huidobrensis* και *L. bryoniae* και επομένως η ταυτοποίηση απαιτεί εργαστηριακό (μορφολογικό ή μοριακό) έλεγχο.**

<u>Μέτρα στις περιοχές της χώρας που δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού</u>

Κάθε υπόνοια παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού (ιδίως ασυνήθιστα έντονες προσβολές από λιριόμυζες σε θερμοκήπια ή αποτυχία ελέγχου με τα συνήθη σκευάσματα) αναφέρεται άμεσα στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 37/2021.

<u>Μέτρα σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων προς τις υποδείξεις των υπηρεσιών.</u>

Το άρθρο 10 του Π.Δ. 37/2021 (Α΄ 94) και ο Ν. 2147/1952 (Α΄ 155), όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 5087/2024 (Α΄ 25), περιγράφουν πλήρως το κυρωτικό σύστημα στον τομέα της φυτοϋγείας καθώς και τις μη συμμορφώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αγγελική Χατζοπούλου